

Reconnaître le scarabée japonais (*Popillia japonica*) organisme de quarantaine

Une menace pour les cultures, les forêts et les espaces verts

Classé comme organisme de quarantaine (organisme nuisible particulièrement dangereux aux végétaux), le scarabée japonais peut causer d'importants dégâts aux plantes cultivées, sauvages et ornementales : **tout soupçon de sa présence sur le territoire doit être signalé au plus vite.**



Comment le reconnaître :

1

Sa taille (environ 1 cm) :
plus petit qu'une pièce de 5 centimes !




2

Ses couleurs :
- tête et thorax vert métallique
- dos (élytres) couleur cuivre

3

Abdomen :
- 5 petites touffes de poils blancs de chaque côté
- 2 plus grosses touffes à l'extrémité



Que faire en cas de suspicion :




1. Capturer l'insecte et l'enfermer dans un bocal.
2. Attention aux confusions possibles : comparer s'il ne s'agit pas d'une espèce proche (voir au verso).
3. Si le doute persiste, placer l'insecte au congélateur au moins 2 heures.
4. Prendre plusieurs photos de l'insecte mort (côtés et dos).

5. A: Faire votre annonce sur votre portable:



B: Faire votre annonce à l'aide du formulaire en ligne sur la page de l'inspectorat: DGAV/ Inspectorat/ Popillia

Reconnaître le scarabée japonais : confusions possibles

 Scarabée japonais <i>Popillia japonica</i>	 Hanneton horticole <i>Phyllopertha horticola</i>	 Cétoine dorée <i>Cetonia aurata</i>	 Hanneton commun <i>Melolontha melolontha</i>
COULEURS ET ASPECT			
tête et thorax vert métal  élytres cuivrées brillantes	mêmes couleurs même brillance  corps plus longiforme	corps entier vert métal  stries blanches sur les élytres	élytres brunes et recouvertes de poils  abdomen terminé en pointe
DIMENSIONS			
taille : ~ 1 cm 	taille similaire (1 cm) 	près du double (1.5 - 2 cm) 	près du triple (2 - 3 cm) 
PRÉSENCE ET RÉPARTITION DES POILS			
2 grosses touffes de poils blancs à l'extrémité  5 petites touffes de poils blancs bien démarquées sur les côtés	poils sur tout le corps (élytres, thorax)  poils diffus tout autour de l'abdomen (pas de touffes)	touffes de poils sur le côté uniquement 	poils blancs courts disposés en triangle sur les côtés 

Crédits images :

© 1. Christian Schweizer, Agroscope

© 2. Canton Tessin, Service phytosanitaire

© 3. Thomas Shahan, Oregon Department of Agriculture

© 4. Lech Borowiec, University of Wrocław

© 5. www.ukbeetles.co.uk

© 6-10. Marguerite Chartois, INRAE

Plus d'informations sur cet organisme à la rubrique « Scarabée japonais » sur :
www.vd.ch/inspectorat-phyto



Remerciements :

Service phytosanitaire du Canton de Berne pour mise à disposition de sa fiche «Merkblatt-Popillia-japonica-Schrebergaerten»

Surveillance du scarabée japonais (*Popillia japonica*) dans le canton de Vaud

Originaire du Japon, le scarabée japonais *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Scarabaeidae) a été introduit accidentellement aux États-Unis au début du XXe siècle et peut engendrer des dommages considérables. Cet insecte très polyphage peut se nourrir sur plus de 400 différentes espèces végétales, aussi bien des plantes cultivées, sauvages qu'ornementales. La période de développement de l'œuf au coléoptère adulte dure le plus souvent une année. Le coléoptère hiberne au dernier stade larvaire et s'enfonce dans le sol pour échapper au froid. Lorsque la température du sol dépasse 10°C au printemps, les larves migrent vers la surface et commencent à se nourrir au niveau des racines. Les larves se métamorphosent après 4 à 6 semaines. La principale saison de **vol des adultes se situe entre mi-mai et mi-août**.

Après une première découverte en Europe sur les Açores dans les années 70, le scarabée japonais s'est établi en Italie près de Milan à partir de 2014. En raison des dégâts qu'il occasionne il est classé, en Europe, comme « Organisme de quarantaine prioritaire ». A ce titre il fait partie des organismes surveillés par l'inspecteurat phytosanitaire cantonal (IPC).

Pour la première fois, en 2017, il a été identifié en Suisse, plus précisément dans le canton du Tessin, où il se propage progressivement. Jusqu'en 2022, seules des détections isolées ont été signalées à l'échelle nationale. Toutefois, en 2023, des foyers ont été découverts en Valais, à Zürich (Kloten) et à Bâle.



Popillia japonica sur feuille de vigne au Tessin (Michel Jeanrenaud)

Popillia est en mesure de se propager par différents moyens. Les **œufs et les larves** sont disséminés par le transport de végétaux en pots et conteneurs et le déplacement de terres ou de compost. Les **adultes**, en plus d'être en mesure de voler sur plusieurs kilomètres, sont aussi opportunistes et profitent des nombreux moyens de transports existants (voitures ; camions ; camping-car ; trains ; etc.).


Un plan cantonal d'urgence est en place pour anticiper l'arrivée de ce nouveau ravageur. Il est basé sur le plan fédéral et les stratégies seront adaptées en fonction de la gravité de la situation.

En 2025, la surveillance du canton repose sur un réseau de **pièges** et sur un **formulaire d'annonce électronique**. Le réseau de pièges sera installé dans les lieux critiques sur l'ensemble du territoire cantonal. Le formulaire d'annonce permet de localiser et de prendre des photos de l'insecte par votre téléphone mobile. Etant donné la ressemblance avec plusieurs autres scarabées, il est important de vérifier qu'il s'agisse bien de *Popillia japonica*. Pour éviter toute confusion, une fiche d'identification est accessible dans le formulaire. Il est important que toute identification soit annoncée dans les plus brefs délais.

Ce scarabée est petit (pièce de 5 centimes), avec un thorax vert, un dos couleur cuivre. Les éléments distinctifs les plus caractéristiques sont les **5 petites touffes de poils blancs latérales** et les **2 grosses touffes blanches** à l'arrière de l'abdomen.

Comment le reconnaître :

- 1 Sa taille (environ 1 cm) :**
plus petit qu'une pièce de 5 centimes !
- 2 Ses couleurs :**
 - tête et thorax vert métallique
 - dos (élytres) couleur cuivre
- 3 Abdomen :**
 - 5 petites touffes de poils blancs de chaque côté
 - 2 plus grosses touffes à l'extrémité



Extrait de la fiche d'identification 2025 de la DGAV (Disponible sous : DGAV/ Inspectorat/ Popillia)

En cas de suspicion, vous pouvez faire une annonce à l'aide de votre téléphone à l'aide du QR code ci-contre en quelques clics.

Nous reprendrons contact avec dès que possible.



En cas de question ou pour tout renseignement pour pouvez nous contacter à cette adresse : popillia.dgav@vd.ch

Michel Jeanrenaud - Inspectorat phytosanitaire cantonal

Av. de Marcelin 29 – 1110 Morges

Inspectorat.phyto@vd.ch